

Link do produktu: <https://sklepzielarski-piaseczno.pl/narimax-tabletki-500-mg-30-tab-p-75.html>



Narimax Tabletki 500 mg, 30 tab.

| | |
|--------------|---------------------------|
| Cena | 39,50 zł |
| Dostępność | Dostępność - 3 dni |
| Czas wysyłki | 48 godzin |
| Kod EAN | 4850016650180 |

Opis produktu

Tabletki na żołądek Narimax to suplement diety, który służy do utrzymania składu i aktywności biologicznej normalnej mikroflory jelitowej u dzieci i dorosłych.

W naszej ofercie znajdziesz ponadto [probiotyk dla dzieci Narine](#).

Produkt jest wskazany:

- jako wsparcie podczas i po antybiotykoterapii,
- jako potrzebie uzupełnienia flory bakteryjnej jelit o bakterie Lactobacillus Acidophilus,
- przy długotrwałym stresie.

Składniki:

- laktoza,
- Lactobacillus acidophilus Er-2 szczep 317/402 Narine,
- celuloza mikrokrystaliczna (MCC 101).

Zalecana porcja dzienna:

- Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 2-3 tabletki 3 razy dziennie,
- Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 1 tabletki 3 razy dziennie,
- Dzieci w wieku od 3 do 6 lat: 1 tabletki 2 razy dziennie.

Skład zalecanej porcji dziennej:

| | 1 kapsułka | 2 kapsułki | 3 kapsułki | 6 kapsułek | 7 kapsułek | 8 kapsułek | 9 kapsułek |
|--|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Lactobacillus acidophilus Er-2 szczep 317/402, Narine | 1,5 x 10 ⁷ CFU*/g | 3 x 10 ⁷ CFU*/g | 4,5 x 10 ⁷ CFU*/g | 9 x 10 ⁷ CFU*/g | 10,5 x 10 ⁷ CFU*/g | 12 x 10 ⁷ CFU*/g | 13,5 x 10 ⁷ CFU*/g |

W jednej kapsułce znajduje się nie mniej niż **1,5 x 10⁷ CFU*** żywych bakterii.

*CFU – Colony Forming Unit – Jednostka do tworzenia kolonii bakteryjnych.

Czas przyjmowania:

dla optymalnego efektu zaleca się przyjmować przez 5-6 tygodni.

Sposób użycia:

Tabletki na żołądek Narimax 500mg należy przyjmować 15-20 minut przed posiłkami z ½ szklanki napoju o temperaturze pokojowej (najlepiej z mlekiem, poza przypadkami nietolerancji produktów mlecznych).

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie spożywać przy nadwrażliwości na składniki produktu. Kobiety w ciąży i karmiące powinny spożywać preparat po konsultacji z lekarzem.

Warunki przechowywania: Przechowywać w chłodnym miejscu w temperaturze nie wyższej niż + 10 °C w sposób niedostępny dla dzieci. Na czas transportu może być przechowywany w temperaturze pokojowej.

Najlepiej spożyć przed końcem: data na boku opakowania. Nie należy stosować po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.